



GENERAL GUIDELINES FOR USE

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO



1. Hold grip section of bottle under spray nozzle.
 Sostenga la sección de agarre de la botella debajo de la boquilla rociadora.



2. Turn nozzle to "ON" setting.
 Gire la boquilla hasta el ajuste "ON" (Abierta).



3. If present, remove heavy soil loads prior to disinfecting.
 En caso de presencia de mucha suciedad, límpiela antes de desinfectar.



4. Position spray bottle toward untreated surface. Using index finger, squeeze trigger to dispense liquid.
 Oriente la botella de aerosol hacia la superficie sin tratar. Con el dedo índice, apriete el gatillo para dispensar el líquido.



5. Spray Sani-Prime™ Germicidal Spray 6-8 inches from surface. Apply to surface until thoroughly wet.
 Rocíe el Aerosol Germicida Sani-Prime™ a una distancia de 6 a 8 pulgadas de la superficie. Aplique el producto en la superficie hasta que quede bien mojada.



6. Allow surface to remain treated for one (1) minute. After one (1) minute contact time, the surface may be wiped dry if needed with a clean cloth. (Consult your facility's protocol for proper selection of cloth material and disposal of used cloth).

Deje que el desinfectante repose en la superficie por un (1) minuto. Después de un (1) minuto de contacto, puede secar la superficie con un paño limpio, si es necesario. (Consulte el protocolo de su establecimiento para seleccionar el tipo correcto de material del paño y el método de eliminación del paño usado).

